

DISAVIR

1. NOMBRE: DISAVIR

2. COMPOSICIÓN

10 ml. Solución en gel que contiene 0,5 gr. de Hidróxido de Potasio y agua purificada.

3. PRESENTACIÓN

Solución en gel para aplicación local. Frasco de 10 ml. Tapón de seguridad con dosificador.

4. ¿PARA QUÉ UTILIZA DISAVIR?

Este producto está concebido para el tratamiento local cutáneo del *Molluscum Contagiosum* y otras viriasis cutáneas indicadas por su médico.

5. CUÁNDO NO UTILIZAR DISAVIR

- 1.-En niños menores de 3 años.
- 2.-En las mucosas y contorno de ojos.
- 3.-Se recomienda no utilizar esta solución en pacientes con eccema atópico en fase aguda y en personas con el sistema inmunitario deteriorado.

En caso de duda, consultar con su médico

6. PRECAUCIONES DE EMPLEO:

Este producto es irritante, aplique la solución solo en las zonas afectadas. En caso de duda, consulte a su médico.

7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:

- 1.-Si entra en contacto con la piel alrededor de la lesión aclare con agua abundante.
- 2.-Si entra en contacto con los ojos aclare con agua abundante y consulte con su médico.
- 3.-No se frote los ojos, ni las mucosas si el producto se ha vertido accidentalmente en los dedos, lávese las manos inmediatamente.

8. CÓMO UTILIZAR DISAVIR

Uso externo. Mientras la utilización de DISAVIR, colocar el frasco sobre una superficie plana para evitar que su contenido se derrame.

9. MODO DE EMPLEO

1.- Abra el frasco y succione una pequeña cantidad de DISAVIR apretando el cuentagotas. 2.- Escurra bien en el borde del frasco, para evitar poner más cantidad de la necesaria sobre la lesión. 3.- Apretar el cuentagotas de forma suave y así depositar la cantidad necesaria, dependiendo del diámetro de la lesión. 4.- Dejar secar. 5.- Repita la aplicación sobre la lesión durante varios días, hasta la aparición de una inflamación (enrojecimiento), lo que suele ocurrir en un plazo de tiempo de tres a diez días. Cuando aparezca la inflamación (enrojecimiento) detenga la aplicación de DISAVIR, la inflamación normalmente precede en 2 a 6 semanas a la desaparición de la infección cutánea. 6.- A la aplicación de DISAVIR, le acompaña a menudo una sensación pasajera de picor o ardor. En caso de manifestaciones más importantes (irritación muy intensa o quemaduras) detenga inmediatamente la aplicación de DISAVIR y consulte a su médico. 7.- Si usted debe de tratar un gran número de lesiones es aconsejable aplicar primero DISAVIR sobre dos o tres lesiones, a título de prueba, con el fin de asegurarse la tolerancia del producto. 8.- No aplicar sobre una lesión inflamada (enrojecida). 9.- No aplicar el DISAVIR encima de una misma lesión más de catorce días.

10. POSOLOGÍA

Una o dos aplicaciones al día, por la mañana y por la noche. Cuando aparezca la inflamación (enrojecimiento) detenga la aplicación de DISAVIR. Aplicar la solución únicamente sobre la lesión a tratar.

11. EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los productos de aplicación cutánea, puede producir efectos más o menos molestos, especialmente sensación de quemazón o irritación transitoria.

12. RECOMENDACIONES

No compartir toallas. No utilizar baños o piscinas públicas en caso del *Molluscum Contagiosum*.

13. CONSERVACIÓN

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el frasco. Volver a cerrar bien el frasco después de su utilización. Mantener fuera del alcance de los niños. El frasco puede conservarse durante un mes una vez abierto.

V:JNy n:>
NQT:>ñ10S

11IAVSIQ

D I S A
SCIENTIFIC OVER TULUGV

DISAVIR
SOLUCIÓN CUTÁNEA
TRATAMIENTO
DEL MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM

D I S A
SCIENTIFIC OVER TULUGV

DISAVIR
SOLUCIÓN CUTÁNEA
TRATAMIENTO
DEL MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM

Ob\U Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

nomud exercitium ultrico
bhnri nbi m; aliquip et ea
commuJa CUnkIWIL OulUC
irrh; (olor in hprdu:nt:hric
in vulupult; vJic ess: cillum
dolor: cu fugiu null. puiarur.
Excepteur
silt ocaccn eur, id: it non
pIoidem, swm In cu pl qui offid
desc, tum mollit illum id en
b. borum.

Ingrediente:
Hidróxido de Nuisio 5%.

SOLUCIÓN
CUTÁNEA

DISAVIR
SOLUCIÓN
CUTÁNEA

ATENCIÓN:
Este producto es confiable.

TRATAMIENTO
DEL MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM

0000 ml. 0000 fl. Oz.



Uso tópico

Modo de uso:

Tempus ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Precaución:

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

C. N., 000000000

8 437012 289062

Loc:XXXXXXXX

TRATAMIENTO
DEL MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM

0000 ml. 0000 fl. Oz.



Uso tópico

DISA

C/ Colombia, 39
E. calera 1 - 1° C.
18016 Madrid

DISA

C/ Colombia, 39
E. calera 1 - 1° C.
28016 Madrid